

解熱鎮痛劑
緩解疼痛及發燒
寶 舒 錠
PINSU Tablets

【作用】

具有與水楊酸鹽 (如Aspirin) 相同之鎮痛解熱功用，直接作用於體內熱調節中樞，以增加末梢血流及出汗，加速體熱散出，而且較不會刺激胃部。

【有效成分及含量】每錠含：

Acetaminophen..... 500mg
其他成分 (賦形劑)：Dried Potato Starch、Starch 1500、PVP K90、Potassium Sorbate、Talc、Stearic Acid

【用途 (適應症)】

退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3歲以下。
 2. 成人連續服用本類製劑超過7天，小孩超過三天，症狀未緩解的人。
 3. 有肝臟疾病的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 2. 同時服用含 acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 服用過量的 acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 acetaminophen 超過4000毫克發生肝臟損害。
 5. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 有急性肝衰竭的風險。

【用法用量】

用法	發燒或需要時服用，若有症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每24小時內不可超過4次。	
用量	成人及12歲以上	每次1錠
	6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2錠
	3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4錠
	3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部 位	副作用
皮 膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 服用本藥三天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
3. 服用過量 (每日超過服用本藥三天後，發燒、疼痛症狀未見改善。4000毫克)，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
4. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】 2~1,000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【儲存】 請置於緊密容器內，並於25°C以下存放。

衛署藥製字第011969號

Code No. (TKP) 018

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248·470-3249

MU3609