

抗過敏劑
尅敏錠2毫克
KOUMIN Tablets 2mg

Chlorpheniramine Maleate 經分光透析含有二種同質異性物，即消旋及右旋二種，本品為右旋型。

【有效成分及含量】每錠含：

Dexchlorpheniramine Maleate..... 2mg

其他成分(賦形劑)：Lactose、Dried Potato Starch、Brilliant Blue FCF、Magnesium Stearate

【用途(適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【使用上注意事項】

1、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。

2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 3歲以下。

2. 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

3. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

2. 65歲以上。

3. 服用鎮靜劑或安眠藥的人。

4. 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

5. 曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀的人。

4、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量。

4. 不得與酒精性飲料併用。

5. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險器械。

【用法用量】

成人及12歲以上	每次1錠，一日3至4次，每次間隔4小時以上服用
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2錠
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4錠
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治，不宜自行使用

【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮
其他	口乾、視覺上之困擾

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

1. 若有任何不適情況產生。

2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】6~1000錠玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】於25℃以下保存。

衛署藥製字第026549號

Code No.

TKP
134



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248、470-3249

MU3405