

解熱鎮痛劑  
緩解疼痛及發燒

# 賓舒加強錠

## PINSU EXTRA Tablets

### 【作用】

1. 經臨床證實為鎮痛、解熱劑。其鎮痛、解熱效果與阿司匹靈相等。
2. 含咖啡因，口服後，可溫和地刺激中樞神經，使人保持清醒。咖啡因與 Acetaminophen 合併使用。當作頭痛治療劑。

### 【有效成分及含量】每錠含：

Acetaminophen 500mg 及 Caffeine Anhydrous 65mg  
其他成分 (賦形劑)：Croscarmellose Sodium、Avicel、Kollidon、Pregelatinized Starch、Povidone K90、Potassium Sorbate、Aerosil、Stearic Acid

### 【用途 (適應症)】

退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

### 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 12 歲以下。
  2. 成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過三天，症狀未緩解的人。
  3. 有肝臟疾病的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  2. 同時服用含 acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- 四、其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量。
  4. 服用過量的 acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 acetaminophen 超過 4,000 毫克 (mg) 會發生肝臟損害。
  5. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
  6. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

### 【用法用量】

用法	發燒或需要時服用，若有症狀持續，則每 4~6 小時可重複服用，每 24 小時內不可超過 4 次。	
用量	成人及 12 歲以上	每次 1 錠
	12 歲以下	請洽醫師診治

### 【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部 位	副作用
皮 膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 服用本藥三天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
3. 服用過量 [ 每日超過 4,000 毫克 (mg) ]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
4. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】2~1,000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】請置於緊閉容器內、並於 25°C 以下存放。  
衛署藥製字第 045885 號

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

Code No. (TKP) 029



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路 237 號

電話：(03)470-3248·470-3249 MU5003