

博 敏 安 膠 囊

Pomian Capsules

本品由三種分別且有強肝、解毒、抗過敏作用之藥劑，而能發揮相乘之功效。

【作 用】

Glycyrrhizin	促進副腎皮質激素活化作用，對蕁麻疹、濕疹相關症狀有緩解作用。
Orotic Acid	在體內可以生成特有物質 UDG (uridine diphosphate glucuronic acid)，可協助肝臟解毒作用，協助緩解過敏等症狀。
Chlorpheniramine Maleate	能拮抗導致過敏的組織胺 (Histamine) 或類似物質，以達到抗過敏的效果。

【有效成分及含量】每粒膠囊含：

Ammonium Glycyrrhizinate..... 100mg
Orotic Acid..... 60mg
Chlorpheniramine Maleate..... 5mg

其他成分 (賦形劑)：Dried Potato Starch、Brilliant Blue FCF Tartrazine、Titanium Dioxide、Gelatin、Purified Water、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine

【用途 (適應症)】

暫時緩解過敏性鼻炎，枯草熱所引起之相關症狀 (流鼻涕，打噴嚏，眼睛及喉部搔癢) 及過敏所引起之搔癢，皮膚癢疹。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 高醛固酮的人 (Aldosteronism)。
3. 肌肉病變的人 (Myopathy)。
4. 低血鉀症的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 正在服用以下藥品的人：Fyrisenude，Ethacrynic Acid 以及 Thiazide 類利尿劑的人。
2. 3 歲以下。
3. 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、青光眼的人、以及因前列腺肥大引起排尿困難的人。

三、有下列情形者，使用前請洽醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 65 歲以上。
3. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
4. 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 不得與酒精性飲料併用。
5. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

成人	一日 2 次，1 次 1 錠
小兒	依年齡適當減量

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用。
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 電解質代謝：偶而有低血鉀症、血壓上升、Na⁺ 體液滯留浮腫、體重增加等 Pseudoaldosteronism 症之出現時，應作血中 K⁺ 值測定，並停止用藥。
2. 神經肌肉：低血鉀症偶爾曾造成肌肉病變，可能有無力感，四肢痙攣，麻痺等現象。

【包裝】4 ~ 1000 粒鋁箔盒裝及瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】請置於緊閉容器內、並於 25℃ 以下存放。

衛署藥製字第 026136 號

Code No. TKP-017



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248 · 470-3249

MU4010