

- (2) 肝 臟：極少例有肝炎出現。
- (3) 代謝異常：有低鈉血症，低鉀血症，血中鈣上昇等現象出現，有高尿酸血症，高血糖症出現時，應減量或停藥。
- (4) 過 敏 症：有出現斑疹，顏面潮紅或對光線過敏時，應中止使用。
- (5) 消 化 器：偶而出現食慾不振，噁心、嘔吐、胃部不適、下痢、便秘，極少例有胰臟炎、唾液腺炎。
- (6) 精神神經系：偶而有眩暈，極少例有知覺異常現象。
- (7) 眼：極少例有霧視、黃視症。
- (8) 呼吸器：間質性肺炎、肺水腫。
- (9) 其他：偶而有倦怠感，極少例有全身性紅斑性狼瘡，肌肉痙攣。
5. 孕婦、哺乳婦之使用：
Thiazide 系藥物，易使新生兒血小板減少，故對懷孕末期及哺乳中之婦女，應避免使用。
6. 乳兒之使用：易產生電解質不平衡，應慎重使用。
7. 相互作用：
與下列藥品併用時，需慎重使用：
(1) 含 Ethanol 飲料 (會增強起立性低血壓)。
(2) Norepinephrine 等 Catecholamine (會使血管壁反應性低下)。
(3) 與其他降壓劑併用時，應注意調整其用量。
(4) Digitalis (會增強對心臟作用)。
(5) 糖質副腎皮質 Hormone 劑，ACTH (會放出過多的鉀)。
(6) 糖尿病用藥 (會減弱糖尿病用藥之作用)。
8. 臨床檢查值之影響：
會使非甲狀腺障礙患者血清之 PBI 值低下。
9. 其他：需夜間休息之患者，為避免夜間排尿，請於午前使用。
10. 警語：急性近視與續發性隅角閉鎖型青光眼：Hydrochlorothiazide 是一種磺胺類藥物，會引起特異體質反應，導致急性短暫近視與急性隅角閉鎖型青光眼，症狀包括急遽的視力下降或眼部疼痛，通常發生在開始用藥後數小時至一週內。急性隅角閉鎖型青光眼若未加以治療，可能導致視力永久喪失，主要治療方式為儘快停止使用 Hydrochlorothiazide。若仍未能有效控制眼壓，可能即需考慮立即尋求醫療或手術程序。引發急性隅角閉鎖型青光眼的風險因子，包括曾使用磺胺類或青黴素等藥物發生過敏的病史。
11. 光過敏：曾有使用 Thiazide 類利尿劑而發生外露部位皮膚紅疹 (光線敏感症) 的案例。如果發生光線敏感症，建議停止治療。如果再次投藥是必要的，建議保護陽光或人工輻射曝曬的部位。
12. 非黑色素細胞惡性皮膚腫瘤 (non-melanocytic skin malignancies, NMSC)：研究發現與本品結構相似的 hydrochlorothiazide (HCTZ) 與非黑色素細胞惡性皮膚腫瘤 (non-melanocytic skin malignancies, NMSC) 之間存在有具累積劑量依存性的關聯性，藥物的光敏感極可能是潛在作用機轉。因此處方本藥品時應告知病人相關風險。若發現可疑皮膚病，建議告知您的處方醫師，必要時請皮膚科醫師檢查。

【包 裝】

4 ~ 1000 錠，PTP 鋁箔盒裝及玻璃瓶裝。

【貯 存】

PTP 鋁箔盒裝貯存：避濕氣，避光保存，並於 25℃ 以下存放。
衛署藥製字第 010917 號

Code No.



MU0708



日本杏林製藥株式会社 授權
杏林新生製藥股份有限公司 製造



桃園市龍潭區三和里店湖一路 237 號
電 話：(03)470-3248 · 470-3249