

利尿降壓劑
泌排特[®]錠
Behyd[®] Tablets
ベハイド錠

「泌排特」是心、腎、肝、內分泌、營養性、神經性等障礙引起之浮腫，對於水份及 Na^+ 有強制排泄療效，而同時產生血壓降下作用，又與易引起直立性低血壓，便秘，口渴，視力障礙等副作用之神經節遮斷劑或與會引起精神抑鬱，嗜眠，鼻塞之 Reserpine 等藥劑併用時，可減少其副作用，並可減少上述藥劑之用量。

「泌排特」之合成法是日本杏林獨創並獲世界專利之產品。

【成份】

每錠含有：

Benzylhydrochlorothiazide 4mg

【賦形劑】

Lactose、Dried Potato Starch、Magnesium Stearate

【藥理作用】

○利尿作用

「泌排特」對於重碳酸鹽， K^+ 之喪失極少，故反覆使用也不攪亂體內電解質之平衡，而且兼備水銀利尿劑與碳酸脫水酵素抑制劑之作用，鹽類排泄效果較hydrochlorothiazide 強約 6 倍。增加 Cl^- 之排泄，但尿之 PH 則無變化。

○血壓降下作用

「泌排特」係抑制細尿管之 Na^+ 吸收，使 ATP-ase 不活性化，而強化血管壁，減低血壓。

【適應症】

利尿，高血壓。

【用法用量】

成人一天 2 次，一次 1~2 錠，視年齡症狀輕重而酌量之。

維持量以一週 2~3 次間歇投與。

本藥須由醫師處方使用。

【警語與注意事項】

1. 一般注意：

- (1) 因本劑之利尿效果顯著，從少量開始服用，再徐徐增量。
- (2) 連續服用時，需定期檢查電解質是否失調。

2. 禁忌：

- (1) 無尿及急性腎不全之患者。
- (2) 體液中鈉、鉀明顯缺少之患者。
- (3) 以往對 Thiazide 系藥物及類似化合物 (如 chlortalidone 等 sulfonamide 衍生物) 有過敏症之患者。

3. 慎重使用：

- (1) 肝硬變之患者 (引發肝性昏睡) 。
- (2) 高齡心疾病患者，嚴重冠狀動脈硬化症及腦動脈硬化症之患者。
- (3) 嚴重腎障礙之患者及肝疾患、肝機能障礙之患者。
- (4) 本人或家屬有痛風、糖尿病之患者。
- (5) 下痢、嘔吐、高鈣血症、副甲狀腺機能亢進症之患者。
- (6) 服用 Digitalis，糖質副腎皮質 Hormone 劑及 ACTH 之患者。
- (7) 交感神經切除後之患者。

4. 副作用：

- (1) 血液：極少例有血小板減少，白血球減少，再生不良性貧血，紫斑等現象出現時，中止使用。