

5. 過敏症：
有發疹、顏面潮紅或對光線過敏時，應停藥。
6. 消化器：
胃潰瘍、口渴、下痢、食慾不振、噁心、嘔吐、軟便或偶而胃部不適、便秘、唾液腺炎。
7. 眼：偶而會有霧視、黃視症。
8. 呼吸器：間質性肺炎、肺水腫。
9. 其他：
鼻塞、倦怠感或偶而全身性紅斑性狼瘡，肌肉痙攣、呼吸困難、體重增加。

五、妊婦、哺乳婦之投與：

1. 動物試驗 Reserpine 有催畸型作用。故對懷孕初期或可能懷孕之婦女勿投與。：
2. Reserpine 及 Benzylhydrochlorothiazide 會通過胎盤及移至母乳，易使新生兒氣道內分泌物增加，鼻充血，發紺、食慾不振，血小板減少，故對懷孕末期及哺乳中之婦女，應避免投與。

六、相互作用：

1. 與下列藥品併用時，需慎重投與：
(1)含 Ethanol 飲料(會增強起立性低血壓)。
(2)Norepinephrine 等 Catecholamine (會使血管壁反應性低下)。
(3)Digitalis, Quinidine (不整脈)。
(4)糖質副腎皮質Hormone劑，ACTH (會放出過多的鉀)。
(5)糖尿病用藥(會減弱糖尿病用藥之作用)。
(6)Levodopa (會減弱 Levodopa 之效果)。
(7) β -阻斷劑 (會增強 β -阻斷劑及本劑之副作用)。
(8)抗憂鬱劑及 MAO 抑制劑。
(9)交感神經阻斷劑 (起立性低血壓)。
2. 併用其他降壓劑時，應注意調整其用量。

七、臨床檢查值之影響：

會使非甲狀腺障礙患者血清之 PBI 值降低。

八、其他：

1. 需夜間休息之患者，應午前投與，避免夜間排尿。
2. 因投與初期及投與中會有嗜眠、無力感，故駕車及操作危險機械之患者，宜注意。
3. 以 Rat 長期經口投與 Reserpine 0.25mg / kg / 日以上，103 週後發現其副腎髓質有褐色細胞腫。
4. 避光保存。

九、光過敏：曾有使用 Thiazide 類利尿劑而發生外露部位皮膚紅疹（光線敏感症）的案例。如果發生光線敏感症，建議停止治療。如果再次投藥是必要的，建議保護陽光或人工輻射曝曬的部位。

十、非黑色素細胞惡性皮膚腫瘤（non-melanocytic skin malignancies, NMSC）：研究發現與本品結構相似的 hydrochlorothiazide (HCTZ) 與非黑色素細胞惡性皮膚腫瘤（non-melanocytic skin malignancies, NMSC）之間存在有具累積劑量依存性的關聯性，藥物的光敏感極可能是潛在作用機轉。因此處方本藥品時應告知病人相關風險。若發現可疑皮膚病，建議告知您的處方醫師，必要時請皮膚科醫師檢查。

警告：有嚴重憂鬱狀態之患者，使用時應特別注意。

警語：急性近視與續發性隅角閉鎖型青光眼：Hydrochlorothiazide 是一種黃胺類藥物，會引起特異體質反應，導致急性短暫急性近視與急性隅角閉鎖型青光眼，症狀包括急遽的視力下降或眼部疼痛，通常發生在開始用藥後數小時至一週內。急性隅角閉鎖型青光眼若未加以治療，可能導致視力永久喪失，主要治療方式為儘快停止使用 Hydrochlorothiazide。若仍未能有效控制眼壓，可能急需考慮立即尋求醫療或手術程序。引發急性隅角閉鎖型青光眼的風險因子，包括曾使用磺胺類或青黴素等藥物發生過敏的病史。

【用法用量】

通常 1 次 1 錠 1 日服用 2 次維持量則視其症狀作適宜增減。
本藥須由醫師處方使用。

【包裝】

4 ~ 1000 錠，PTP 鋁箔盒裝及玻璃瓶裝。
衛署藥製字第 029106 號

【貯存】

PTP 鋁箔盒裝貯存：避濕氣，避光保存，並於 25℃ 以下存放。

本品 Code No: 

MU0806



日本杏林製藥株式会社 授權
杏林新生製藥股份有限公司 製造
桃園市龍潭區三和里店湖一路237號
電話：(03)470-3248 · 470-3249