

眼壓下降劑
福 樂 多 注射液
FRUCEROL Injection

【成份】每ml含

Glycerin..... 100mg
Fructose..... 50mg
Sodium Chloride..... 9mg
賦形劑：Sodium Bisulfite，注射用水

【適應症】

治療顱內壓亢進，顱內浮腫，因顱內壓亢進及顱內浮腫的改善，使下列各疾患所伴隨的意識障礙、神經障礙、自覺症狀亦獲得改善：腦梗塞（腦血栓塞）、腦內出血、蜘蛛膜下出血、頭部外傷、腦腫瘍、腦髓膜炎、腦外科手術後的治療法，腦外科手術時的腦容積縮小。

【用法用量】

1 次 200 ~ 500ml，1 日 1~2 次，以每 2 - 3 小時約 500ml 之速度點滴靜注，通常投與 1 ~ 2 週；使腦容積縮小為目的者，1 次 500ml 於 30 分鐘點滴靜注；對眼內壓下降及眼科手術時之眼容積縮小為目的者，1 次 300 ~ 500ml 於 45 ~ 90 分鐘點滴靜注。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 一般注意事項：
 - 對疑似急性硬膜下，硬膜外血腫患者，在出血源處，需確認無再出血時，才可投與本劑。
 - 本劑含 NaCl，故投與期間，宜控制食鹽之攝取量。
- 禁忌：遺傳性果糖不耐症患者。
- 慎重投與：
 - 患有心臟、循環器機能障礙者。
 - 腎障礙患者。
 - 尿崩症患者。
 - 糖尿病患者（非 ketone 性高滲透壓昏睡現象）。
- 副作用：

偶而有尿潛血反應，血色素尿、頭痛、噁心、口渴、倦怠感。
- 取用時：
 - 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
 - 若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。
- 輸液套選用及插入法：
 - 請依輸液套使用方法正確使用。
 - 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割（Coring）產生碎片。
 - 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【包裝】

200ml	2V	10V	20V
300ml	2V	10V	20V
500ml	1V	10V	20V

衛署藥製字第025355號

MT1706



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248 · 470-3249