

滲透壓性降腦壓利尿劑
滿乃通® 注射液 20 W/V%
MANITON® Injection 20 W/V%

【劑型·劑量】

Manitol Injection 20w/v% : 每 100 毫升含 Mannitol 20gm
賦形劑：注射用水。

【臨床藥理】

- 一、滲透壓降壓作用：依文獻資料，通常在輸注後 15 分鐘可發生效用。
1. 具有縮小腦容積及降低腦壓之作用。
2. 降低急鬱性青光眼內壓上升。
- 二、利尿作用：依文獻資料，一般於使用後 1~3 小時可發生效用。
1. 能增加腎血流量。
2. Mannitol 能保持原狀迅速通過腎絲球且不被腎小管再吸收(80% 的劑量在 3 小時 內排於尿中)，因而能提高腎絲球過濾原尿之滲透壓，並抑制腎小管對鈉、氯或 其他電解質之吸收，促進水分之排除而達到利尿之作用。
3. 由於利尿作用增加毒性物質之排除而免除毒物對腎臟造成之毒性。
4. 與平滑肌鬆弛併用，可促進尿道結時之自然排出。
5. 能誘出組織中過多的水分貯留體內，故能改善由腎損害及心臟功能不全等所引 起之浮腫、肝及肺鬱血、腹水等症狀。
6. 能預防及改善因外傷或手術而引起之尿少症及無尿症。
7. 能大量增加尿排出量，故能阻止腎小管中沉澱物或結石之生成，使腎小管流暢 無阻。
8. 阻止泌尿器官手術後血尿凝固，並能防止因而引起之二次感染。
9. 可作為人工心肺裝置，人工腎臟等之灌流液。

【適應症】

利尿、降顱內壓、腹水腫，促進毒物之尿中排除、腎小球過濾速率之測定(診斷用)。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

滲透壓降壓作用：靜脈輸注，每公斤體重 0.5 gm ~ 2 gm 以 15 ~ 25% 溶液，點滴輸注射 30 ~ 60 分鐘。

利尿作用：靜脈輸注，50 ~ 100 gm (或兒童 2 gm/kg 或每公尺體表面積 60 mg) 的 5 ~ 25% 溶液，以維持尿液每小時流量至少為 30 ~ 50 ml 之速率點 滴輸注。

診斷用(腎功能)：靜脈輸注，每公斤體重 200 mg 以 15 ~ 25% 溶液於 3 ~ 5 分鐘注入體 內。

腎小球過濾速率測定：靜脈輸注，20 gm (20% 溶液 100 ml) 以 180 ml 氯化鈉注射液稀 釋成 7.2% 甘露醇溶液，以每分鐘 20 ml 之速率給藥。

【注意事項】

- 禁忌：無尿症、嚴重的肺水腫或鬱血性心衰竭，顱內出血，嚴重脫水。12 歲以下孩 童禁用。
- FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數) : C，在人體懷孕及授乳者之安全性尚 未建立，應權宜利弊使用。
- 於冬季或冷藏時，有時會產生結晶，此時可將保溫於攝氏 40 ~ 50 度，待溶解後冷 至體溫即可供注射用，其效果不變。
- Mannitol 注射液因具有強力利尿作用，故於手術中應裝配導尿管以利排尿。
- 運輸過程中容器可能因重擊，震動而產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有此等情 況，請勿使用。
- 若藥液有不澄清，變色，異物或其他異常現象時，請勿使用。
- 輸液套選用及插入時，請依輸液套使用方法正確使用，請勿扭轉，以免因針割產生 碎片，使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【副作用】

較常見之副作用為體液或電解質不平衡，常發生於大劑量快速給藥後，細胞外液過度 增加使血循環負荷過重或利尿過度引起脫水及電解質減少之現象，如口乾、口渴、頭 痛、視力模糊、噁心、嘔吐、酸中毒、發燒、冷顫、眩暈、低血壓、心跳過速等。

【儲存】於 25°C 以下存放。

【包裝】100 ml, 300 ml, 500 ml, 100 支小瓶以下裝。

衛署藥製字第 009633 號
MT1609



日本杏林製藥株式會社 授權
杏林新生製藥股份有限公司 製造
桃園市龍潭區三和里店湖一路 237 號
電話：(03) 470-3248, 470-3249