

輔酵素型Vitamin B₆製劑

“杏林” 俾燐勝注射液 20毫克

Pyridoxal Phosphate Injection 20mg “Kyorin”

1939年，Kuhn Harris等合成Vitamin B₆對於老鼠的癩皮樣皮膚炎有療效。到了1951年Heyl等，對酵素化學研究中，證明了B₆的活性體Pyridoxal-5-Phosphate，與體內氨基酸的脫炭酸及胺基移轉有作為輔酵素作用的關係，為身體內蛋白質代謝的重要必需物，本品即利用此種輔酵素型Vitamin B₆為主成分之製劑。

【成分】

每1 Amp (2mL) 含 Pyridoxal Phosphate..... 20mg.
賦形劑：Benzyl Alcohol, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, 注射用水。

【作用特點】

(1) 促進皮膚粘膜的新陳代謝

很早以前，Gyorgy氏即認為Vit. B₆能維持皮膚的正常組織機能。

(2) 蛋白質、氨基酸代謝的正常化

本品與蛋白質、氨基酸的代謝有關的種種酵素的輔酵素代謝正常化，如分解Allergy發生物質Histamine的Histaminase的輔酵素作用，而可治療Allergy症，又妊娠忌阻或妊娠中毒時，缺乏B₆將會引起Tryptophan代謝異常。

(3) 肝機能充進作用

肝病惡時，血清胺基移轉酵素的活性上昇及肝胺基移轉酵素活性低下，而本品也是脂質、糖質代謝有關之輔酵素，使其正常化，使肝糖量提高而強化肝解毒機能。

(4) 膽固醇的降低作用

本品能減少血中總膽固醇，防止脂質的組織沈著。

(5) 抗貧血作用

本品是Porphyrine Cycle第一環的合成時之輔酵素，促進紅血球的新生機能，改善低色素性貧血。

(6) 改善神經系機能

本品能維持神經系機能的正常化，改善各種神經症狀。

(7) 毒性

本品毒性極低，臨床上極少有副作用。

【適應症】

急、慢性濕疹、蕁麻疹、皮膚瘙癢症、口角炎、口唇炎、舌炎、維他命B₆缺乏症。

【用法用量】

通常1天5~30mg行皮下、肌肉或靜脈注射，按年齡症狀適宜增減。
本藥限由醫師使用。

【包裝】

2mL×10Amp、2mL×50Amp、2mL×100Amp（茶色）紙盒裝。

【儲存】

於25℃以下避光保存。

衛署藥製字第009346號

MT0805



日本杏林製藥株式会社 授權

杏林新生製藥股份有限公司 製造

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248、470-3249