

非有機鹼性鎮咳・抗過敏性劑
“杏林” 咳服寧[®] 糖衣錠
COUGHMIN[®] S.C. Tablets
コフミン (KYORIN)

本劑乃許多動物暨臨床上試驗之結果，由比利時—Labaz 之研究所製造之非有機鹼性鎮咳劑。

本劑係以無麻醉中樞作用，而確證具有較 Codeine 大 1.5 倍鎮咳作用之 Dibunate Sodium 配合一般抗組織胺劑中副作用最少之 Chlorpheniramine Maleate 與副作用比 Ephedrine 更少之 dl-Methylephedrine HCl 而成為有迅速鎮咳效果而無 Codeine 般習慣性，對一般鎮咳劑無效的各症亦有特效，即便長期連用亦無嘔氣，胃氣障礙，習慣性等副作用，對於乳幼兒內服特別容易且安全可靠。

【組 成】本劑每錠中含有

Dibunate Sodium.....	15mg
dl-Methylephedrine HCl.....	4mg
Chlorpheniramine Maleate.....	1mg

【賦形劑】

Lactose、Dried Potato Starch、Magnesium Stearate、HPMC 2910、PEG 6000、Diabasic Calcium Phosphate、Talc、PVP K-90、Powdered Acacia、Cellulose Crystalline、Sugar、New coccine、Sunset yellow FCF、Polishing Wax-105

【作 用】

1. Dibunate Sodium

本成份之鎮咳作用（機序）依據 Chakravarty 等報告，於所作之動物實驗中，對由中樞刺激而促成之咳嗽，經服用本成分後，發現其作用僅止於延髓內之咳嗽中樞而已，至於呼吸中樞則絲毫未受影響，若投與 Codeine 則呼吸中樞與咳嗽中樞同樣地受到抑制，本成份之鎮咳作用比 Codeine 強約 1.5 倍，毒性則不到 Codeine 之 1/2，即耐性一點，據所知也比 Codeine 高約 3 倍，且有緩和之祛痰作用並能促進炎症部位分泌物之排除，而副作用則殆無所見。

2. Chlorpheniramine Maleate

本成分係具有優越療效之抗組織胺劑，亦為毫無不良副作用之藥劑，治療作用為 Benadryl 之 5~10 倍，持續作用也比同類製劑更長，而用量則只少許便可奏效，而且吸收非常良好，並能發揮鎮痙與鎮靜作用。

3. dl-Methylephedrine HCl

本成份之抗組織胺作用或抗 Acetylcholine 或抗過敏性作用等均遠比 Ephedrine 強，而且 Ephedrine 常使脈搏及血壓升高，而 Methylephedrine 可說無此現象。

以上各成分經配合後，由於相互相乘之結果，使本劑藥效大為增強，而為各種過敏性疾患治療上作用卓越之製劑。

【適應症】

鎮咳、祛痰（因咽頭炎、急性支氣管炎、支氣管氣喘、氣喘性支氣管炎、支氣管擴張症等之咳嗽、喀痰伴發之各種疾患）。

【用法用量】

成人 1 次 2~4 錠，小孩一次 1~2 錠，每日 3 次，於食間服用。本藥須由醫師處方使用。

【注 意】

1. 一般注意:

- (1) 依用法、用量正確使用無效時，中止使用。
- (2) 勿過度連續使用，以免出現心律不整或心跳停止。
- (3) 有嗜眠之顧慮，使用本劑之患者勿開車或操作危險機械。

2. 禁忌:

- (1) 綠內障之患者。
- (2) 前列腺肥大尿路閉塞之患者。

3. 慎重使用:

- (1) 甲狀腺機能亢進症之患者。
- (2) 心疾患之患者。
- (3) 高血壓之患者。
- (4) 糖尿病之患者。

4. 副作用:

- (1) 過敏症:有出現斑疹，搔癢感時，中止使用。
- (2) 循環器:偶而出現心悸，臉色蒼白。
- (3) 精神神經系:神經過敏，焦燥感，複視，頭痛，偶而灼熱感，極少例有不眠，眩暈，疲勞等現象。
- (4) 泌尿器:出現多尿，排尿困難。
- (5) 消化器:出現口渴，偶而食慾不振，下痢，噁心，嘔吐，腹部膨脹感等現象。
- (6) 血液:極少例有血小板減少症，無顆粒球症，再生不良性貧血等現象出現時，中止使用。

5. 孕婦之使用:

對孕婦之使用安全性未確定，故對孕婦及可能懷孕之婦女，請考量治療上有益性大於危險性時才使用。

6. 相互作用:

- (1) 因含有 Chlorpheniramine Maleate，若併用酒精類及中樞神經抑制劑，MAO 阻礙劑，則有相互增強作用，故需減量小心使用。
- (2) 因含有 dl-Methylephedrine HCl，若併用 MAO 阻礙劑，甲狀腺製劑 Thyroxine，Liothyronine 等)，則有增強作用，故需減量小心使用。宜避免併用 Epinephrine，Isoprenaline 等 Catecholamine，以免出現心律不整或心跳停止。

【包 裝】

30 錠，100 錠，500 錠，1,000 錠，瓶裝。

衛署藥製字第 012880 號

【儲 存】

請置於緊閉容器內、並於 25℃ 以下存放。

MU1707



日本杏林製藥株式会社 授權

杏林新生製藥股份有限公司 製造

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248・470-3249