

胃潰瘍、十二指腸潰瘍治療劑

新力胃能錠 LEWEILEN Tablets

本劑直接作用於胃腸黏膜上，能預防或治療因暴飲暴食或緊張生活所導致的胃痛、潰瘍、胃部不適感、十二指腸潰瘍等病變。

【有效成分及含量】：

Methylmethionine Sulfonium Chloride..... 27mg
Sodium Copper Chlorophyllin..... 4mg
Synthetic Aluminum Silicate..... 160mg
Dried Aluminum Hydroxide Gel..... 140mg
Scopoliae Extract..... 14mg

其他成分 (賦形劑)：Lactose、Dried Potato Starch、ECG 505、Magnesium Stearate、Trisodium Glycyrrhizinate

【用途 (適應症)】：

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急、慢性胃炎、胃酸過多、胃痛。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 正在使用其他抗胃痙攣藥物的人。
 2. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 腎衰竭病患 (長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 本藥含有葉綠酸 (Chlorophyllin)，因此服用後會產生綠色糞便。
 5. 本品每錠之酸中和能力為 5.0 mEq。

【用法用量】：

年 齡	劑 量
成 人	1 次 1 錠，每日 3 次，食後或食間服用。
8 ~ 15 歲	適用成人使用量之 1/2。

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副 作 用
腸 胃 道	便秘、噁心、嘔吐。
其 他	口 乾。

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 連續服用2週以上，而症狀並無改善。
2. 若有任何不適情況產生。

【包裝】6 ~ 1000 錠玻璃瓶裝及鋁箔盒裝。

【儲存】請置於緊閉容器內，避濕氣，並於 25℃ 以下遮光保存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 027517 號

Code No. 



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電 話：(03)470-3248 · 470-3249

MU3307