

消化性潰瘍治療劑
“杏林”平克疾[®]顆粒
PECSIE[®] Granules “Kyorin”
ペクシー[®]

“PECSIE”是由具有制酸及炎症粘膜保護雙重作用之 Gastric Mucin 所配合而成之一種消化性潰瘍治療劑。

【作用】

- (1) Gastrin Mucin：具有黏膜保護以及胃酸中和緩衝作用。
- (2) Dried Aluminum Hydroxide Gel：胃酸中和。
- (3) Magnesium Trisilicate：具有制酸作用。

【有效成分及含量】

本品為綠色，且具甘味之顆粒，1g 中含有下列有效成份：

Gastric Mucin.....	0.260g
Dried Aluminum Hydroxide Gel.....	300g
Magnesium Trisilicate.....	0.396g

其他成分（賦形劑）Sodium Copper Chlorophyllin、Trisodium Glycyrrhizinate

【用途（適應症）】

緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良。

【使用上注意事項】

- 1. 有下列情形者，請勿使用：①曾因本藥成分引起過敏的人。
- 2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - ① 3 歲以下。
 - ② 消化道潰瘍的人。
 - ③ 有腎臟疾病的人。
 - ④ 腎衰竭病患（長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用）。
- 3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - ① 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - ② 與其他藥品併用時。
- 4. 其他使用上注意事項：
 - ① 糞便可能會呈現綠色，是因為藥品中含有Chlorophyllin 成分的關係。
 - ② 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - ③ 避免陽光直射。
 - ④ 勿超過建議使用量。
 - ⑤ 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

【用法用量】

用法	用量
1 天 3 次	1 ~ 1.5g

【警語】

- 1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

- 2. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治
 - ① 若有任何不適情況產生。
 - ② 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】1000g 以下鋁箔盒裝、塑膠罐裝。

【儲存】請置於緊閉容器內、並於 25℃ 以下存放。

衛署藥製字第022861號

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。



日本杏林製藥株式会社 授權

杏林新生製藥股份有限公司 製造

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248・470-3249

MU0505