

制 酸 劑
立 舒 吧[®] 散
RESPER[®] Powder

本藥是制酸劑，可以緩解胃炎或消化性潰瘍所伴隨的慢性不適症狀。

【有效成分及含量】每 1 gm 中含有：

Metamagnesium Aluminosilicate..... 500 mg.
Precipitated Calcium Carbonate..... 460 mg.
單次劑量之酸中和能力(總制酸力)為 19.2 mEq，鎂含量為 3 mEq。
其他成分 (賦形劑)：Powdered Glycyrrhiza。

【用途 (適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - 1. 消化道潰瘍的人。
 - 2. 3 歲以下。
 - 3. 腎衰竭病患 (長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 2. 與其他藥品併用時。
- 四、其他使用上注意事項：
 - 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 2. 避免陽光直射。
 - 3. 勿超過建議使用量。
 - 4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續用一日最大使用量兩週以上。

【用法用量】

成人及 12 歲以上	1 次 1gm，1 天 3 至 4 次，或需要時服用。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

- 服用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用。
胃 腸 道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉。
其 他	長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、頭痛、意識不清、厭食等現象。

- 服用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - 1. 若有任何不適情況產生。
 - 2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】6~1000g 塑膠罐裝。(附 1gm 量匙)

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】請置於緊閉容器內、並於 25℃ 以下存放。
衛署藥製字第 008608 號



日本杏林製藥株式会社 授權
杏林新生製藥股份有限公司 製造
桃園市龍潭區三和里店湖一路237號
電 話：(03)470-3248 · 470-3249

MU0207