

# 止瀉劑 力克明 膜衣錠 Recmin F.C.Tablets

## 【有效成分及含量】每錠中含有：

Berberine Tannate..... 33mg  
Scopolia Extract..... 3.3mg  
其他成分 (賦形劑)：Avicel PH101、Dried Potato Starch、Starch 1500、Magnesium Stearate、H.P.M.C 606、PEG 6000、Titanium Dioxide、Food yellow No.4

## 【用途 (適應症)】

緩解輕微或中度急性腹瀉。

## 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 6歲以下。
  2. 有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似病症的人。
  3. 帶有嘔氣、腹痛、腹部膨脹等症狀之急性下痢的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量。
  4. 腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。
  5. 不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。
  6. 止瀉劑之服用間隔應在4小時以上。
  7. 急性腹瀉不得使用超過48小時。

## 【用法用量】

年 齡	劑 量
成人及12歲以上	每次3錠，一天3至4次，或需要時服用。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2(每次1.5錠)
6歲以下	請洽醫師診治

## 【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
- 一、若有任何不適情況產生。
  - 二、連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】18 - 1000 錠 PTP 鋁箔盒裝、玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】請置於緊閉容器內、並於25℃以下存放。  
衛部藥製字第058349號



杏林新生製藥股份有限公司  
桃園市龍潭區三和里店湖一路237號  
電話：(03)470-3248 · 470-3249

MU6702