

滴 必 克 錠500毫克 (梯尼達諾) TIBICAN Tablets 500mg (Tinidazole)

本品具抗原蟲作用，對陰道滴蟲、赤痢變形蟲及藍氏賈第鞭毛蟲等原蟲感染症有良好功效，為 Imidazole 系化合物的衍生物，臨床實驗證實本品之毛滴蟲治療較 Metronidazole 為佳，並具有優越的親脂力，很容易穿透滴蟲的細胞壁而維持長期及高血中濃度，配偶雙方同時服用本品治療後，再感染機會幾乎沒有，且對男女均有一樣功效。

【成 分】

每錠含 Tinidazole..... 500mg

【賦 形 劑】

Lactose、Dried Potato Starch、Starch 1500、PVP K90、Magnesium Stearate

【作 用】

1. 對 T·Vaginalis 之最小發育阻止濃度 0.13 ~ 1µg / ml，最小殺蟲濃度 1µg / ml (48小時)，而於 4µg / ml 之濃度則 6 小時內完全有殺蟲效果。
2. 對 T·Vaginalis 腔內感染之 Rat，以 15mg / kg / 日，投與 5 天，其殺蟲率 85%。
3. 對 T·Vaginalis 腹腔內感染之 Mouse，以 50mg / kg / 日投與 3 天或以 70mg / kg 投與 1 次，其殺蟲率 100%。
4. 對 Bacteroides，Peptococcus，Peptostreptococcus，Clostridium 等之嫌氣性菌有效。
5. 對 Amebiasis (阿米巴赤痢)，Giardiasis 也有良效。

【適 應 症】

毛滴蟲感染引起之膇炎。

【用法用量】

1. 生殖泌尿系陰道滴蟲症，成人每天 1 次，每次 4 錠，治療期 1 天。
2. 變形蟲症 (痢疾變形蟲症或其他腸變形蟲症)，每天 1 次，每次 4 錠，治療期 3 天。
3. 賈第鞭毛蟲痢疾症，每天 1 次，每次 4 錠，治療期 1 天。飯前或飯後服用。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- ◎禁忌：(1) 對本品有過敏之患者；(2) 有血液疾患之患者；(3) 腦、脊髓系疾患之患者 (類似化合物長期服用有腦波異常之報告)。
- ◎副作用：(1) 過敏症：偶有發疹等過敏現象；(2) 消化器：偶有食慾不振、噁心、胃部不快感、舌苔、腹痛等現象；(3) 血液：偶有白血球減少現象；(4) 生殖器：在治療中可能出現 Candida albicans。(5) 其他：偶有頭痛、頭重、口渴、尿著等現象。
- ◎孕婦、授乳婦：(1) 本品可能經胎盤關門而移向胎兒，妊娠中投藥之安全性還未確立，孕婦 (3 個月以內) 及可能懷孕之婦女不得投藥。妊娠 4 個月以上者，必須在有益性及危險性之判斷後始予投藥；(2) 本品可能移行至乳汁中，故授乳婦投藥時必須中止授乳。
- ◎相互作用：因飲酒而引起腹部疝痛、嘔吐、潮紅之情形，投藥中應避免飲酒。
- ◎其他：長期大量投藥 (600mg / kg / 日) 時，有 Rat 之精巢萎縮之報告。

【包 裝】100's：盒裝及瓶裝。

衛署藥製字第 026583 號

【儲 存】請置於緊密容器內，並於 25℃ 以下存放。

Code No. (TKP) 030



杏林新生製藥股份有限公司

桃園市龍潭區三和里店湖一路237號

電話：(03)470-3248 · 470-3249

MU3804